



Hvordan håndteres bivirkninger til **Grazax** og **Acarizax**?

Smeltetabletten **Grazax** eller **Acarizax** SKAL tages 1 gang om dagen og cirka på samme tidspunkt hver dag.

Smeltetabletten må tages senere på dagen, hvis det faste tidspunkt er glemt. Dog må du ikke indtage to smeltetabletter på samme dag, så fremt du glemte det dagen før.

Almindeligt forekomne bivirkninger

- Kløe i mundhulen.
- Prikkende fornemmelser - (oftest under tungen).
- Hævelse i munden - (oftest under tungen).
- Lokal hævelse af læberne.
- Hals irritation.
- Kløe i ørerne.
- Nysen.

Bivirkninger vil for **Grazax** forekomme tidligt i behandlingen og er tilbøjelige til at aftage spontant inden for 1 - 7 dage

For **Acarizax** gælder, at bivirkningerne hyppigst vil starte tidligt i behandlingen og aftager igen ved fortsat behandling (1-3 måneder).

Åbne sår i mundhulen:

- Opstår der åbne sår i munden fx pga. en udtrukket tand eller andre indgreb i munden, da skal behandlingen med smeltetabletten ophøre i 1 uge, så mundhulen får tid til at hele.

Følgende kan hjælpe med at afdæmpe bivirkningerne:

1. Når du har lagt smeltetabletten i munden og holdt munden lukket i 1 minut (vær sikker på, at Smeltetabletten er helt opløst), da kan du spytte mundvandet ud.
2. Hjælper ovenstående ikke, da kan du tage en ekstra antihistamin-/allergitabelt
3. Ved vedvarende gener under tungen (hvilket er det bedste sted at ligge smeltetabletten), da kan du forsøge, at skifte placering rundt i mundhulen.

Det vigtigste er, at smeltetabletten ligger op ad slimhinderne, hvor dens indhold vil blive optaget.

Du kan ligge smeltetabletten alle steder i munden - på udvendig side af tænderne, så den ligger fast mellem "læber" og tænder.

4. Kan bivirkningerne/irritationerne i mundhulen ikke dæmpes tilstrækkeligt og ved træthed, da kan smeltetabletten i stedet tages til natten.

Svære bivirkninger

- Klump i halsen.
- Synkebesvær.
- Stemmeændring.
- Åndenød.
- Astmaen kan ikke holdes under kontrol.
- Udslæt.
- Svimmelhed
- Kløe i håndflader og fodsåler

Oplever du svære bivirkninger eller andre komplikationer, da bedes du kontakte

Klinik for Lungesygdomme
på telefon 78448010