



vaccination mod tuberkulose

Du har nu fået en BCG-vaccination (Calmette).
Du må ikke blive vaccineret med andre levende vacciner de næste fire uger - f.eks. MFR og gul feber.
Du må ikke blive vaccineret i samme arm i 3 mdr.

Eftervirkninger

Du bliver ikke syg efter vaccinationen, men det er almindeligt at opleve følgende bivirkninger:

Der kan forekomme en mindre hævelse af lymfeknuderne i armhulen.

Hvis du mærker, at dine lymfeknuder er større end ca. 1 cm i diameter, skal du kontakte os.

Tre til otte uger efter vaccinationen kan der komme et sår på det sted, du blev vaccineret.

Såret kan blive betændt og væskende.

Dette sår skal tørre ind, så der dannes et ar.

Hvis du er generet af såret, kan du lægge en tør forbindelse over.

Såret skal ikke behandles.

Du må gerne bade, tage solbad og være fysisk aktiv, selv om såret ikke er lægt.

Det kan vare op til et halvt år, før såret er lægt. Hvis det varer længere, skal du kontakte os.

Er du ellers i tvivl om sårets udseende, skal du kontakte os.

Med venlig hilsen
personalet i

Klinik for Lungesygdomme

Tlf. 78448010 eller 78448020