


Mannitol-test. Astmadiagnose



Hvad er formålet med undersøgelsen:

Formålet med undersøgelsen er en vurdering af, om du har astma. Undersøgelsen afslører, om dine luftrør er særlige følsomme.

Forberedelse til undersøgelsen:

Du må ikke ryge i 6 timer før undersøgelsen.

Du må ikke indtage koffein såsom cola, kaffe, the, energidrikke, og chokolade før undersøgelsen på dagen.

Du bør være udhvilet og ikke have været udsat for større fysisk anstrengelse inden undersøgelsen.

Hvis du har haft en infektion i luftvejene i de sidste 3 uger før undersøgelsen, skal du kontakte os, da undersøgelsen i så fald må udsættes.

Hvis du får lungemedicin mod astma og allergi, må du ikke tage følgende præparater forud for undersøgelsen.

Det er vigtigt at du holder medicinpause efter instrukser fra den læge, der har henvist dig.

Instrukser til medicinpause er:

8 timer: Korttidsvirkende – inhalationsmedicin, Buventol E., Ventoline...

12 timer: Korttidsvirkende – inhalationsmedicin, Atrovent, Berodual..

24 timer: Langtidsvirkende – inhalationsmedicin, Formo E., Striverdi..

24 timer: Tablet Theo-Dur, Unolin, Bricanyl R.

3 døgn: Tablet Depot Theofyllin

3 døgn: Langtidsvirkende – inhalationsmedicin, Spiriva, Sebri..

4 døgn: Tablet Montelukast (Singulair), Antihistamin, Aerius, Revitelle, Benadryl..

6 uger: Forebyggende steroidinhalationer/kombinations-
Inhalationsmedicin, Flutiform, Bufomix...

2 uger: Tablet Prednison

Hvis du får tiltagende symptomer eller åndenød i

forbindelse med medicinpausen bedes du kontakte os,

da det kan blive nødvendigt at genoptage behandlingen.

Hvad er Mannitol?

Mannitol er et sukkerstof.

Mannitol virker ved at trække væske ud af slimhinden i luftvejene, og det kan give tørhed i svælget, hoste og øget slimproduktion. Du kan opleve åndenød, en forbigående forsnævring af luftvejene, hvis dine luftveje er følsomme.



Hvordan foregår testen:

Mannitol gives som inhalationspulver i kapsler.

Du inhalerer Mannitol gennem en inhalation, i stigende doser.

Din lungefunktion følges nøje mellem hver inhalation og når målingen viser at et astmaanfald er på vej (at en forsnævring af luftvejene er på vej) standses undersøgelsen og der gives straks astmamedicin.

Astmamedicinen udvider luftvejene igen. Du når derfor kun at få lette vejrtræknings symptomer.

Hvor længe varer undersøgelsen:

Undersøgelse og observationsperioden er 1 – 2 timer.

Bivirkninger.

Ved inhalering af Mannitol kan der opstå forbigående hoste, åndenød (astmasymptomer), kvalme, hovedpine og ømhed i næse og hals.

Der er ingen senreaktion.

Forholdsregler efter undersøgelsen

Ingen.

Undersøgelsen udføres i Klinik for Lungesygdomme Skive

Med venlig hilsen Personalet i Klinik for Lungesygdomme
Telefonnummer: 7844 8022 eller 7844 8010