

Information om lungebiopsi

Hvad er lungebiopsi?

En lungebiopsi er en lille prøve fra vævet i lungen. Formålet med vævsprøven er at stille en diagnose.

Før lungebiopsien

Den dag, du skal have taget lungebiopsien, møder du på lungemedicinsk afsnit M13-2 på Regionshospitalet Viborg. Undersøgelsen foregår ambulant. Du møder om formiddagen og tager hjem om eftermiddagen.

Du skal faste, dvs. at du hverken må spise, drikke mælkeprodukter eller ryge fire timer før lungebiopsien. Du må dog gerne indtage klare væsker, og vi anbefaler at du drikker, kaffe, te, juice, saft eller lignende indtil to timer før mødetidspunktet. Du må gerne tage din vanlige medicin med mindre andet er aftalt.

På afsnittet tager en sygeplejerske imod dig. Du vil få tilbudt let smertestillende, samt afslappende medicin. Hvis du har brug for det, giver vi dig også medicin, som dæmper din hoste.


Du bliver hentet på afsnittet af en portør, som kører dig i en seng til og fra billeddiagnostisk afdeling, hvor lungebiopsien bliver taget.

Lungebiopsien

Lungebiopsien foregår ved hjælp af en CT-scanning for at sikre, at prøven bliver taget det rigtige sted.

På lejet i CT-scanneren ligger du enten på maven, ryggen eller siden, og du ligger med armene oppe over hovedet.

Det er meget vigtigt, at du ligger så stille som muligt, og at du holder vejret på de tidspunkter, du får besked om.



Kort før lægen tager prøven, lægges der lokalbedøvelse i huden. Det kan gøre lidt ondt, men det er hurtigt overstået, og resten af indgrebet er smertefrit.

Lungebiopsien foregår ved, at lægen fører en nål gennem brystvæggen og henter et lille stykke lungevæv ud. I det øjeblik lægen tager prøven, hører du nogle korte smæld fra det udstyr, der bliver brugt til at tage prøven med. Hele forløbet varer i alt ca. 30 minutter.

Efter lungebiopsien

Efter undersøgelsen kommer du tilbage til lungemedicinsk afsnit. Den første time skal du ligge i sengen, og herefter må du gerne stå op, bare du forholder dig i ro.

Du er meget velkommen til at få noget at spise og drikke lige så snart, du kommer tilbage til afsnittet.

Efter cirka tre timer bliver dine lunger kontrolleret med et røntgenbillede, som skal ses og godkendes af en læge. Hvis du ellers har det godt derefter, må du efter aftale med sygeplejersken tage hjem. Det tilrådes ikke, at du selv kører hjem.

Resten af dagen skal du helst undgå for store anstrengelser og kraftig hoste. Du kan blive øm på det sted, prøven er taget, men det hjælper ofte med smertestillende tabletter. Du skal være opmærksom på, om du får åndenød eller trykken for brystet. Sker det, skal du ringe til lungemedicinsk sengeafsnit. Der kan også komme lidt blodigt opspyt, uden at det betyder noget.

Inden du tager hjem, får du en tid til svarsamtale med en læge. Svaret foreligger efter tre hverdage. Det er altid en god idé at tage en pårørende eller en nær bekendt med til denne samtale.

Hos 15-20 % slipper der luft fra lungen ud i lungehulen, og lungen kan klappe sammen. Hvis lungen er klappet sammen, anlægges dræn og du skal være indlagt nogle dage.

Med venlig hilsen
personalet
Medicinsk Afsnit 2 og
Klinik for Lungesygdomme
Lungemedicinske overlæger