



## Information til patienten

### **Forebyggende behandling mod tuberkulose**

Du er blevet smittet med tuberkulose-bakterier, men du smitter ikke andre.

For at forebygge at du bliver syg af smitten, skal du behandles med tabletter i seks måneder. Medicinen tages én gang dagligt om morgenen og består af Isoniazid og pyridoxin. Sidstnævnte er vitamin som hindrer bivirkning. Du skal tage en tablet om morgenen i 6 måneder.

#### *Virkning:*

Bakteriedræbende, bruges til behandling mod tuberkulose.

#### *Mulige bivirkninger:*

Snurren i arme og ben, nedsat hukommelse, træthed, kvalme, gulfarvning af huden, hudkløe.

Tuberkulose-medicin tåles normalt godt, men risikoen for bivirkninger stiger hos personer over 35 år.

### **Stop med medicinen**

Efter 6 måneder.

### **Kontrol efter endt behandling**

Du skal have taget et røntgenbillede af dine lunger når du slutter med medicinen og 6 måneder derefter.

**Hvis du ikke ønsker tabletbehandling**

Risiko for at udvikle tuberkulose er 5-10% - størst de første to år. Du kan derfor blive tilbudt røntgenkontrol af dine lunger, 6 og 12 måneder efter du er konstateret smittet.

**Symptomer på tuberkulose**

Træthed, vægttab, appetitløshed, temperaturforhøjelse nattesved, hoste med opspyt, der kan være blodigt

Med venlig hilsen

Personalet  
Klinik for Lungesygdomme